



สารความรู้จากองค์การบริหารส่วนตำบลลำป่า

PUBLIC RELATION OF LAMPAM SUBDISTRICT ADMINISTRATIVE ORGANIZATION

WWW.LAMPAM.GO.TH / โทรศัพท์-โทรสาร 074 - 829825 / FACEBOOK : อบต.ลำป่า

สธ 2/2560

ไข้เลือดออก อันตรายกว่าที่คุณคิด!



"ไข้เลือดออก" เป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส โดยจะมี "งูยุงกลาง" เป็นพาหะนำโรคเกิดได้ตลอดทั้งปี ระบาดมากในช่วงฤดูฝน โดยไข้เลือดออกมีงูยุงกลางเป็นพาหะนำเชื้อโรค โดยกัดและดูดเลือดคนที่ป่วยแล้วไปกัดคนอื่นที่ไม่ป่วยในแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว

"งูยุงกลาง" ออกหากินในตอนกลางวัน งูยุงกลางจะวางไข่เพาะพันธุ์ในภาชนะที่มีน้ำขัง และเป็นถิ่นที่ แต่ไม่ชอบวางไข่ในที่อับชื้น บางชนิด น้ขัง นหนอง ดulong บึง ฯลฯ



ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสไข้เลือดออก เมื่อถูกงูยุงกัดแล้วประมาณ 1 สัปดาห์ ก็จะเริ่มป่วย คนที่มีไข้เกิน 3 วัน ควรรีบไปพบแพทย์ทันที หลังจากที่มีไข้ 2-3 วัน ผู้ป่วยบางราย จะมีจุดเลือดสีแดงบริเวณใต้รักแร้ หรือแขน ฯลฯ และลำตัว มีเลือดกำเดาออก อาเจียน ถ่ายเป็นสีดำ ปวดท้อง ปวดกระดูกตา หากมีอาการรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิต ถ้าเป็นโรคไข้เลือดออก "ห้ามใช้ยาแอสไพริน" และรีบไปพบแพทย์โดยด่วน!



เราสามารถป้องกันและกำจัดงูยุงกลางได้อย่างไร?

หลักการ 5 ป. ช่วงฤดูฝนได้!

1. ป. ปิด = ปิดฝาภาชนะกักเก็บน้ำทุกชนิด
2. ป. เปลี่ยน = เปลี่ยนน้ำในภาชนะต่าง ๆ ทุก 7 วัน
3. ป. ปล่อง = ปล่องปลากินลูกน้ำในภาชนะต่าง ๆ
4. ป. ปรับปรุง = ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมรอบบ้าน
5. ป. ปฏิบัติ = ปฏิบัติ 1 - 4 จนเป็นนิสัย

เพียงเท่านี้ เราก็รอดพ้นจากไข้เลือดออกโดยมีงูยุงกลางเป็นพาหะแล้ว



ปิด เปลี่ยน ปรับปรุง ปล่อย ปฏิบัติ

